

Maligne bolesti u bolesnika s autoimunim reumatskim bolestima

Čuti, Tea

Master's thesis / Diplomski rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Medicine / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:052829>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-27**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of Medicine Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Studij medicine**

Tea Čuti

**MALIGNE BOLESTI U BOLESNIKA
S AUTOIMUNIM REUMATSKIM
BOLESTIMA**

Diplomski rad

Osijek, 2015.

Cilj istraživanja: Utvrditi pojavnost malignih bolesti u odre enim autoimunim reumatskim bolestima te istražiti povezanost malignih bolesti s terapijom kori-tenom za lije enje tih bolesti.

Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao retrospektivna studija.

Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uklju eno 1075 bolesnika oboljelih od autoimunih reumatskih bolesti. Podatci su prikupljeni iz medicinske dokumentacije.

Rezultati: Zna ajno ve i broj bolesnika u istraživanju bio je flenskog spola. Prema u estalosti dijagnoza, najve i je udio inila dijagnoza reumatoidnog artritisa (60,19%), zatim sistemskog lupusa (15,53%), mije-anne bolesti vezivnog tkiva (8,09%), Sjögrenova sindroma (7,07%), sistemske skleroze (5,86%), dok najmanje vaskulitisa (2,23%) i PM/DM (1,02%). Naju estaliji je bio tumor dojke (23,55%), zatim cerviksa (13,7%), kolona (9,8%) te limfoproliferativne bolesti i tumori -titnja e (7,5%). Od ukupno 53 slu aja maligne bolesti, 54,9% bilo je u RA, dok kod bolesnika s vaskulitisom nije bilo nijednog. Od lijekova, 60,75% bolesnika koristi NSAID, 79,5% kortikosteroide, 33,05% ispitanika metotreksat, a sulfasalazin 30,07%. Nije prona ena povezanost u u estalosti razvoja maligne bolesti pod utjecajem kori-tenja lijekova.

Zaklju ak: Od autoimunih reumatskih bolesti e- e obolijevaju flene. Najve i broj bolesnika boluje od reumatoidnog artritisa, slijedi sistemska eritematozni lupus, dok ostale bolesti ine manji udio. Imunosupresivna terapija koja se primjenjuje u lije enju autoimunih reumatskih bolesti nema utjecaja na nastanak malignih bolesti.